


Результаты исследований

Данные исследования Ацилакт DUO/Ацилакт Дуо


В исследование включено 116 женщин в возрасте от 18 до 49 лет с рецидивирующим бактериальным вагинозом*
Соответствовало параметрам исследования 100 женщин



ВАЖНО * - у всех пациенток отмечались обострения БВ (4 и более эпизода) в течение последнего года

Состояние микрофлоры в группах через 3 месяца после окончания терапии

Преобладание *Lactobacillus* spp. над условно патогенной флорой




Двухэтапная терапия с Ацилакт DUO/Ацилакт Дуо приводит к нормализации микробиоты у 90% пациенток

Обнаружение «ключевых клеток» в группах через 3 месяца после окончания терапии



Отсутствие «ключевых клеток» в несколько раз чаще встречалось среди пациенток, получавших противорецидивную двухэтапную терапию

Нормальная pH в группах через 3 месяца после окончания терапии



Количество женщин с уровнем pH < 4,5 было достоверно выше в группе Ацилакт DUO/Ацилакт Дуо ($p < 0,05$)

* Уруймагова А.Т., Прилепская В.Н., Межевитина Е.А., Донников А.Е., Абакарова П.Р., Довлетханова Э.Р., Гусаков К.И., Одыванова А.А., Эффективность и приемлемость двухэтапной терапии рецидивирующего бактериального вагиноза. Акушерство и гинекология. 2021; 11: 202-212 <https://dx.doi.org/10.18565/aig.2021.11.202-212>